

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - C00-C97, ohne C44

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	47,0	54,9	,6	31065	3,6
2000 - 2004	48,5	56,5	,5	38559	4,4
2005 - 2009	50,3	59,5	,5	41834	8,4
2010 - 2014	49,7	59,0	,5	41962	29,6

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	40,6	48,7	,8	14855	2,7
2000 - 2004	45,0	53,7	,7	19948	3,7
2005 - 2009	48,0	57,4	,7	22502	7,6
2010 - 2014	46,8	56,3	,7	22798	27,8

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 4,3 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Vergleichswerte - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 56,0
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 65,0
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 62,0

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	52,8	60,2	,8	16210	4,5
2000 - 2004	52,3	59,4	,7	18611	5,2
2005 - 2009	53,0	62,0	,7	19332	9,3
2010 - 2014	53,2	62,2	,7	19164	31,7

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 62,0
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 70,0
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 67,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2016