



Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	21,5	26,6	2,0	1644	1,8
2000 - 2004	22,3	27,3	1,9	1870	2,2
2005 - 2009	22,5	28,4	1,9	1814	4,8
2010 - 2014	23,7	30,0	2,1	1682	15,8

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,7 Jahre  
 2000 - 2004 ,8 Jahre  
 2005 - 2009 1,0 Jahre  
 2010 - 2014 1,1 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	20,2	25,4	2,6	904	1,7
2000 - 2004	20,9	25,7	2,4	1063	1,4
2005 - 2009	23,1	28,6	2,6	1025	5,3
2010 - 2014	20,7	26,2	2,6	970	12,7

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,7 Jahre  
 2000 - 2004 ,9 Jahre  
 2005 - 2009 1,1 Jahre  
 2010 - 2014 1,1 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 30,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 34,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 32,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	23,1	28,0	3,0	740	1,9
2000 - 2004	24,1	29,2	3,0	807	3,2
2005 - 2009	21,8	27,9	2,9	789	4,2
2010 - 2014	27,9	35,3	3,4	712	19,9


**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,8 Jahre  
 2000 - 2004 ,7 Jahre  
 2005 - 2009 ,9 Jahre  
 2010 - 2014 1,2 Jahre

nur Ersterkrankungen

**Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)**  
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 28,0  
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 39,0  
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 33,0

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Magenkarzinom (C16)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	59,5	73,5	5,4	324	4,6
2000 - 2004	62,1	73,9	4,8	393	4,8
2005 - 2009	62,5	75,8	5,1	350	13,7
2010 - 2014	67,8	82,2	6,1	238	45,8

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 >5,0 Jahre  
 2000 - 2004 >5,0 Jahre  
 2005 - 2009 >5,0 Jahre  
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	32,7	39,7	6,9	177	1,1
2000 - 2004	33,1	40,2	6,5	202	3,5
2005 - 2009	37,6	45,9	6,7	202	4,5
2010 - 2014	47,8	57,9	6,5	249	28,1

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 2,6 Jahre  
 2000 - 2004 3,3 Jahre  
 2005 - 2009 4,0 Jahre  
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	13,9	16,8	4,2	266	,4
2000 - 2004	13,4	16,1	4,4	232	2,2
2005 - 2009	17,5	21,9	4,9	228	3,1
2010 - 2014	18,3	22,2	4,4	350	11,7

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 1,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,8 Jahre  
 2005 - 2009 1,6 Jahre  
 2010 - 2014 1,9 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	2,3	2,8	1,3	552	,5
2000 - 2004	2,5	3,0	1,2	712	,6
2005 - 2009	4,0	4,8	1,4	747	1,6
2010 - 2014	3,4	4,1	1,5	598	2,8

**mediane Überlebenszeit**  
 1995 - 1999 ,2 Jahre  
 2000 - 2004 ,2 Jahre  
 2005 - 2009 ,4 Jahre  
 2010 - 2014 ,3 Jahre

nur Ersterkrankungen

**verwendete Sterbetafel:**  
 Sachsen 1995-2016