

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Darmkrebs (C18-21)

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	44,2	53,3	1,4	5110	1,8
2000 - 2004	48,2	57,6	1,3	6118	3,0
2005 - 2009	49,3	60,4	1,2	6363	7,2
2010 - 2014	48,6	59,5	1,3	6000	30,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	43,8	53,2	1,9	2579	1,5
2000 - 2004	48,2	58,0	1,7	3252	2,7
2005 - 2009	50,9	61,7	1,7	3508	6,8
2010 - 2014	49,3	60,2	1,8	3279	29,9

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 60,0
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 66,0
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 63,0

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	44,7	53,4	1,9	2531	2,2
2000 - 2004	48,1	57,1	1,8	2866	3,3
2005 - 2009	47,4	58,7	1,8	2855	7,8
2010 - 2014	47,7	58,7	2,0	2721	30,1

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)
 RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 58,0
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 68,0
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 63,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Darmkrebs (C18-21)

UICC	relatives Überleben	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
UICC I Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC I relatives Überleben nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	72,9	87,6	3,0	838	3,2
		2000 - 2004	78,8	92,6	2,3	1182	4,5
		2005 - 2009	77,5	91,7	2,4	1158	14,4
		2010 - 2014	75,2	89,3	2,7	1093	49,5
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	>5,0 Jahre		
		2000 - 2004	>5,0 Jahre				
		2005 - 2009	>5,0 Jahre				
		2010 - 2014	>5,0 Jahre				
UICC II Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC II relatives Überleben nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	59,1	72,2	2,6	1407	2,0
		2000 - 2004	62,4	75,6	2,4	1609	3,4
		2005 - 2009	61,2	76,8	2,3	1689	9,1
		2010 - 2014	64,0	79,5	2,6	1524	41,1
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	>5,0 Jahre		
		2000 - 2004	>5,0 Jahre				
		2005 - 2009	>5,0 Jahre				
		2010 - 2014	>5,0 Jahre				
UICC III Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC III relatives Überleben nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	43,7	52,0	2,7	1318	1,7
		2000 - 2004	49,1	58,5	2,5	1570	2,7
		2005 - 2009	55,9	67,3	2,4	1669	5,7
		2010 - 2014	56,9	68,4	2,5	1599	29,6
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	>5,0 Jahre		
		2000 - 2004	>5,0 Jahre				
		2005 - 2009	>5,0 Jahre				
		2010 - 2014	>5,0 Jahre				
UICC IV Entwicklung des Gesamtüberlebens UICC IV relatives Überleben nur Ersterkrankungen		1995 - 1999	6,7	8,0	1,5	1047	,7
		2000 - 2004	6,9	8,2	1,4	1341	,8
		2005 - 2009	9,7	11,6	1,5	1447	1,0
		2010 - 2014	9,6	11,6	1,6	1517	7,1
		mediane Überlebenszeit		1995 - 1999	,7 Jahre		
		2000 - 2004	,8 Jahre				
		2005 - 2009	1,0 Jahre				
		2010 - 2014	,9 Jahre				
verwendete Sterbetafel:							
Sachsen 1995-2016							