


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Kehlkopfkarzinom (C32)




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	51,2	58,3	9,0	119	,8
2000 - 2004	53,2	60,5	8,7	126	2,4
2005 - 2009	57,5	64,8	8,8	123	4,9
2010 - 2014	49,7	55,8	9,2	122	27,0

mediane Überlebenszeit

1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	49,1	55,8	9,3	110	,9
2000 - 2004	51,6	59,0	8,9	120	2,5
2005 - 2009	58,0	65,3	9,0	117	4,3
2010 - 2014	48,2	54,0	9,8	108	26,9


mediane Überlebenszeit

1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 58,0
 RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 73,0
 RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 62,0



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	77,8	81,5	.	9	,0
2000 - 2004	83,3	84,2	.	6	,0
2005 - 2009	50,0	53,5	.	6	16,7
2010 - 2014	58,9	66,4	28,6	14	28,6

mediane Überlebenszeit

1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 65,0

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Kehlkopfkarcinom (C32)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	70,4	80,2	17,2	27	,0
2000 - 2004	81,5	96,6	14,7	27	,0
2005 - 2009	79,7	90,1	13,5	35	8,6
2010 - 2014	75,5	87,7	16,1	33	42,4

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	61,9	70,6	20,8	21	,0
2000 - 2004	65,2	71,1	.	23	4,3
2005 - 2009	77,8	84,8	.	18	5,6
2010 - 2014	91,7	100,0	.	13	46,2

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	60,6	67,2	22,8	18	5,6
2000 - 2004	55,6	62,4	23,0	18	5,6
2005 - 2009	62,5	71,3	19,4	24	,0
2010 - 2014	50,1	56,0	27,7	16	31,3

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	11,1	13,0	20,5	9	,0
2000 - 2004	25,9	29,1	16,5	27	,0
2005 - 2009	29,6	32,0	16,5	30	6,7
2010 - 2014	19,4	20,5	13,9	31	6,5

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 1,1 Jahre
 2000 - 2004 1,8 Jahre
 2005 - 2009 1,7 Jahre
 2010 - 2014 2,3 Jahre

nur Ersterkrankungen

verwendete Sterbetafel:
 Sachsen 1995-2016