


Durchschnittlich erfasste Erkrankungszahlen

Zeitraum	Geschlecht	N	rohe Rate	altersstandardisierte Rate (ESR)*	arithm. Alter Jahre	medianes Alter Jahre	Vergleich medianes Alter	Vergleichsquelle
2011 - 2015	männlich	68	3,2	2,9	49,1	49,8	46,5	RKI, BRD 2013-2014
	weiblich	53	2,4	2,7	45,2	43,3	43,5	

* europastandardisierte Rate



Anzahl Neuerkrankungen



Absolute Neuerkrankungen und Neuerkrankungsraten je 100.000 Einwohner

Jahr	absolut männlich	absolut weiblich	Rohe Rate männlich	Rohe Rate weiblich	Stand. Rate männlich	Stand. Rate weiblich
2016	10	11	2,3	2,5	2,2	2,9
2015	11	5	2,6	1,1	2,0	1,3
2014	18	7	4,3	1,6	4,7	1,9
2013	12	9	2,8	2,0	2,5	2,6
2012	11	19	2,6	4,3	2,1	4,7
2011	16	13	3,7	2,9	3,5	3,3
2010	16	8	3,7	1,8	3,1	2,2
2009	20	12	4,6	2,6	4,2	2,8
2008	11	6	2,5	1,3	2,1	1,0
Ø95-07	12	10	2,6	2,0	2,5	2,1

Stand. Rate = Europastandard



Vergleichswerte

RKI, BRD 2014, männlich	3,4
RKI, Sachsen 2003-2004, männlich	2,1
RKI, BRD 2014, weiblich	2,5
RKI, Sachsen 2003-2004, weiblich	1,8

Vergleichswerte





RKI, BRD 2014, männlich	3,1
RKI, Sachsen 2003-2004, männlich	2,0
RKI, BRD 2014, weiblich	2,4
RKI, Sachsen 2003-2004, weiblich	1,7

Zahl der Neuerkrankungen nach Stadt-/Landkreisen

Tumorzentrum Chemnitz	absolut männlich					absolut weiblich				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
Chemnitz, Stadt	5	3	5	4	0	2	2	0	1	6
Erzgebirgskreis (anteilig 66,8%)	2	3	10	3	5	6	2	3	3	2
Mittelsachsen	3	5	3	5	5	2	1	4	4	9
Zwickau (anteilig 21,8%)	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2


Neuerkrankungsrate nach Stadt-/Landkreisen (n/100.000 Einwohner), altersstandardisiert (ESR)

Region	Stand. Rate männlich					Stand. Rate weiblich				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
Chemnitz, Stadt	3,4	1,6	4,3	3,1	,0	1,7	2,0	,0	,5	3,7
Erzgebirgskreis	1,6	2,1	11,0	3,1	3,4	7,0	2,4	3,9	3,3	2,4
Mittelsachsen	2,3	2,6	1,3	2,1	2,7	1,2	,3	2,4	2,9	6,8
Zwickau	,0	,0	,0	,0	2,2	,5	,0	,0	6,4	6,0




Diagnosejahre 2011 bis 2015

Neuerkrankungen/Jahr nach Altersgruppen



Neuerkrankungen/100.000 EW nach Altersgruppen



Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach der Lokalisation (ICD-O)


ICD-O	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
C77.8	Lymphknoten mehrerer Regionen	38	55,9	36	67,9	74	61,2
C77.0	Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses	16	23,5	8	15,1	24	19,8
C77.9	Lymphknoten o.n.A.	3	4,4	2	3,8	5	4,1
C77.1	Intrathorakaler Lymphknoten	1	1,5	3	5,7	4	3,3
C77.2	Intraabdominaler Lymphknoten	2	2,9	1	1,9	3	2,5
C77.4	Lymphknoten der Inguinalregion und des Beines	3	4,4	0	.	3	2,5
C42.1	Knochenmark	2	2,9	0	.	2	1,7
C42.2	Milz	1	1,5	1	1,9	2	1,7
C77.3	Lymphknoten der Achseln und Arme	1	1,5	1	1,9	2	1,7
C34.1	Lungenoberlappen	1	1,5	0	.	1	,8
C71.1	Frontallappen	0	.	1	1,9	1	,8
	Gesamt	68	56,2	53	43,8	121	.

Histologische Häufigkeitsverteilung

Bezeichnung	M-Code	N	%	% gesamt
Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierender Typ o.n.A.	9663/3	50	41,3%	41,3%
Hodgkin-Lymphom, gemischtzellige Form o.n.A.	9652/3	30	24,8%	24,8%
Hodgkin-Lymphom o.n.A.	9650/3	19	15,7%	15,7%
Hodgkin-Lymphom, nodulärer lymphozytenprädominanter Typ	9659/3	9	7,4%	7,4%
Hodgkin-Lymphom, lymphozytenreich	9651/3	8	6,6%	6,6%
sonstige maligne Histologien		5	4,1%	4,1%
maligne Histologien gesamt		121		100%


Ann Arbor Stadium

Jahr	I	II	III	IV	k.A.	gesamt
1995-2011	36	135	102	91	30	394
2012	3	10	8	4	5	30
2013	5	8	4	3	1	21
2014	1	7	8	5	4	25
2015	4	7	2	3	0	16
2016	1	8	8	4	0	21
gesamt	50	175	132	110	40	507
%	10	35	26	22	8	100



Therapien im ersten Jahr nach Diagnosenstellung*

Jahr	RTsT	sT	RT	k.A.*1	k.A.*2	gesamt	RTsT %
2011	12	15	0	2	0	29	41,4
2012	12	15	0	3	0	30	40,0
2013	9	11	0	1	0	21	42,9
2014	7	15	1	2	0	25	28,0
2015	8	5	0	3	0	16	50,0
gesamt	48	61	1	11	0	121	39,7
%	40	50	1	9	0	100	.



sT = systemische Therapie
RT = Strahlentherapie
k.A. = keine Angabe

k.A.*1 = keine tumorspezifische Therapie, jedoch histologisch gesichert
k.A.*2 = keine tumorspezifische Therapie, nur klinische Sicherung des Tumors

Diagnosejahre
2011 bis 2015

Systemische Therapien im ersten Jahr nach Diagnosenstellung*

Beschreibung	Typ	Anzahl	%
Bleomycin, Dacarbazin, Doxorubicin, Vinblastin	C	61	56,0
Bleomycin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Etoposid, Prednison, Procarbazin, Vincristin	C	60	55,0
Medikament o. n. A.	C	7	6,4
Doxorubicin, Etoposid, Prednison, Vincristin	C	5	4,6
Carbustin, Cytarabin, Dexamethason, Etoposid, Melphalan	C	3	2,8
Cyclophosphamid, Prednisolon, Procarbazin, Vincristin	C	2	1,8
Vincristin	C	2	1,8
Bleomycin, Cyclophosphamid, Dacarbazin, Doxorubicin, Prednison, Procarbazin, Vinblastin, Vincristin	C	2	1,8
Bleomycin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Etoposid, Mesna, Prednison, Procarbazin, Vincristin	C	2	1,8
Dacarbazin, Doxorubicin, Vinblastin	C	2	1,8
Rituximab	I	4	3,7
gesamt Anzahl der Fälle		109	.

Protokolltyp:
CM – Monochemoth.
CP – Polychemoth.
C – Chemotherapie o.n.A.
IC – Immun-/Chemoth.
H – Hormontherapie
I – Immuntherapie
IU – unspezif. Immunth.
IS – spezif. Immunth.

gesamt = Anzahl der therapierten Fälle; Mehrfachnennungen von Therapien sind pro Fall möglich; Prozentzahl bezieht sich auf den Anteil an den systemisch therapierten Gesamtfällen

*Bei Eintritt eines Rezidivs werden weitere Therapien nicht ausgewiesen.


Morbus-Hodgkin C81

Diagnosejahre
2008 bis 2013

5-Jahres-Überleben nach Ann Arbor-Stadium

Stadium	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
Ann Arbor I	81,3	84,7	.	16	31,3
Ann Arbor II	89,6	92,8	8,6	51	17,6
Ann Arbor III	77,6	82,2	13,7	36	11,1
Ann Arbor IV	92,0	93,3	.	25	16,0

nur Ersterkrankungen




mediane Überlebenszeit

- Ann Arbor I >5,0 Jahre
- Ann Arbor II >5,0 Jahre
- Ann Arbor III >5,0 Jahre
- Ann Arbor IV >5,0 Jahre

Überleben gesamt, männlich

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	89,7	90,7	6,7	78	,0
3	88,5	91,3	7,1	.	,0
4	85,9	89,8	7,7	.	1,3
5	81,8	87,0	8,6	.	11,5

nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)


RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 63,0

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2011

weiblich

Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	93,4	93,9	6,2	61	,0
2	90,2	91,2	7,5	.	,0
3	88,5	90,4	8,0	.	,0
4	86,9	89,2	8,5	.	4,9

nur Ersterkrankungen



nur Ersterkrankungen

mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 72,0